



Journées de Printemps 2021 : Fourrages et prairies 2.0

La spectrométrie dans le proche infra-rouge pour évaluer la valeur alimentaire des fourrages

- Barre P., Barotin C. (URP3F)
- Andueza D., Picard. F. (UMRH)
- Caillat H. (FERLUS)

- Bonnal L., Julien L., Juanes X., Assouma M.H. (SELMET)

- Maudemain S., Fumat N., El Radi H. (ARVALIS Boigneville)


- Jost J. (IDELE, Mignaloux Beauvoir)



Durabilité des systèmes d'élevage

- Augmentation de l'autonomie alimentaire des exploitations
- Nécessité de mieux valoriser les fourrages produits sur place
- Connaître la valeur alimentaire de ces fourrages





Animal

dMO

MAT

%MS

Laboratoire


Valeur Nutritive
Energie : UF
Azote : PDI
Minéraux

Ingestibilité
Valeur
Encombrement
UE

Valeur
Alimentaire


Besoins
des Animaux

Calcul de ration




ALIMENTATION DES RUMINANTS



Apports nutritionnels – Besoins et réponses des animaux
Rationnement – Tables des valeurs des aliments



<https://www.inration-ruminal.fr/>



Principe de la spectrométrie dans le proche infrarouge



Valider l'estimation sur qq échantillons et mise à jour de l'équation



Teneurs en parois,
cellulose, lignine
(Van Soest)



Digestibilité
cellulase
(Aufrère)





Teneurs en C et N
(Dumas)



Matières minérales
(calcination)

Analyses de référence

+



Equation de prédiction
des valeurs de référence
à partir des spectres IR

Utilisation de l'équation sur de très nombreux
échantillons sans analyse de référence

Nécessité de créer des équations pour les différents types de fourrage

Exemples à l'URP3F:

- Prairies de graminées fourragères récoltées en « vert »
- Prairies de luzerne récoltées en « vert »
- Prairies multi-espèces récoltées en « vert »
- Maïs plante entière

Augmentation de la diversité des fourrages et de leur hétérogénéité

- Récolte sous forme de foin, d'enrubannage ou d'ensilage
- Nouvelles espèces : sainfoin, plantain...
- Mélanges d'espèces : méteils fourragers ou grainiers





Création de nouvelles équations à partir de l'existant: exemple des foins

Possibilité d'utiliser l'équation sur fourrage récolté en « vert » (Andueza et al. 2016)

Confirmation sur des prairies multi-espèces variées (Patuchev et Redcap) projet PSDR FLECHE

Mais nécessité d'intégrer quelques échantillons de foin



Cela n'est pas toujours possible : exemple de l'ensilage, des méteils...

Difficile de capter toute la diversité

Stratégie de bases de données très larges


- Mise en commun des bases prairies entre le CIRAD SELMET, l'INRAE UMRH et URP3F

Lesnoff et al. 2019
Journal of chemometrics

Validation de la transférabilité
entre labos pour
la chimie analytique et
la spectrométrie proche infra rouge


Digestibilité (n=1148)

Graminées,
légumineuses,
céréales,
prairies variées,
arbres



Protéines (n=4075)

Aliments, colza, maïs, ensilage
d'herbe, soja, blé, tournesol...




Difficulté de la
structuration des
échantillons

Stratégie d'estimation en « local »


Méthode: **kNN-Locally Weighted PLS**

Lesnoff et al. 2019
Journal of chemometrics



n échantillons de l'équation

Un nouvel échantillon à estimer




Pas utilisés

Pre-sélection de k voisins

\longrightarrow *poids = $f(\text{distance})$*

Travailler en réseau à distance : exemple CIRAD SELMET



Mesures dans les exploitations

- Différents appareils avec des performances et des prix variés



LabSpec ASD
350-2500 nm
qq dizaines de milliers d'€



AgriNIR Dinamica
1100-1800 nm
qq milliers d'€



SCIO Consumer Physics
740-1070 nm
qq centaines d'€




Tellspec
900-1700 nm
qq milliers d'€

Nécessité d'avoir des équations adaptées aux échantillons analysés

Prise en compte de l'hétérogénéité des échantillons : matériel non broyé

Ecart moyen entre un spectre « idéal » réalisé à partir de 500 spectres et un spectre réalisé à partir de n spectres



Nécessité de mesurer 30 à 40 spectres par échantillon de fourrage non broyé

Evaluation de deux appareils AgriNIR : Copavenir Poitiers et Touraine Conseil Elevage à Tours




Broyé


Sur 66 foins de luzerne



Digestibilité cellulase



Teneur en ligno-cellulose (ADF)



Non broyé

JP2021: Prairies et Fourrages 2.0

Evaluation de deux appareils AgriNIR : Copavenir Poitiers et Touraine Conseil Elevage à Tours




Broyé


Sur 66 foins de luzerne



Teneur en matières azotées totales



Teneur en matières minérales





Non broyé

JP2021: Prairies et Fourrages 2.0

Evaluation de deux appareils très portables: SCIO et Tellspec

Matière sèche de maïs fourrage plante entière



SPIR Tellspec

Incertitude de mesure de 5%, supérieure à celle de l'exploitant (3%)

Conclusions

- La SPIR au labo sur matériel séché broyé peut évaluer de manière précise la digestibilité cellulase et la composition chimique de nombreux fourrages **si des équations appropriées sont développées et maintenues** → gain de temps et de coût / chimie analytique
- Le passage à la valeur alimentaire fait appel à **des modèles à partir de données animales** qui doivent être créés et maintenus
- Il est possible de mettre en commun des bases de données puis d'utiliser des équations en « local » **si la transférabilité entre labos pour les analyses chimiques et SPIR a été validée**
- Il existe de nombreux spectromètres plus ou moins portables, plus ou moins chers et plus ou moins performants
 - Il faut ajuster l'appareil au besoin
- Il faut prendre en compte l'hétérogénéité des échantillons non broyés et le fait de travailler sur du matériel contenant de l'eau

Perspectives

- Développement de nouvelles bases de données pour des fourrages nouveaux : méteils...
- Etudier la possibilité de partager ces bases et de travailler en réseau
- Contribuer à la création de nouveaux appareils très portables et peu onéreux capables de répondre aux attentes des éleveurs pour l'établissement des rations en valorisant au mieux les fourrages produits à la ferme



Charpentier et al. Heliospir 2018



Peuplier noir bords de Loire



JP2021: Prairies et Fourrages 2.0

Merci pour votre attention !



33



34

